

Aus dem Strahlen-Institut (Prof. Dr. Voltz) der Universitäts-Frauenklinik
(Vorstand Prof. Dr. H. Eymer) und dem zahnärztlichen Institut der Universität
München (Vorstand Prof. Dr. P. Kranz)



Über die Anwendung radioaktiver Strahlen in der Zahnheilkunde

Inaugural-Differtation

zur Erlangung der Doktorwürde in der

Zahnheilkunde

verfaßt und einer

Hohen Medizinischen Fakultät der

Bayerischen Ludwigs-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Elifabeth Schöpferl

Zahnärztin aus Regensburg

Meinen lieben Eltern gewidmet!

Wenn Kathodenstrahlen auf die Wandung der Kathodenröhre (gleich Röntgenröhre ohne Antikathode) fallen, so fluoresziert diese grünlich (infolge des Flußspatgehaltes im Glas). Gleichzeitig treten von der Glaswand aus Röntgenstrahlen auf. Es lag die Vermutung nahe, daß zwischen diesen beiden Tatsachen, Fluoreszenz und Auftreten von Röntgenstrahlen, ein Zusammenhang besteht und eben aus dieser Überlegung heraus machte Becquerel im Jahre 1896 diesbezügliche Versuche. Er benützte dazu ein stark fluoreszierendes Uranfalz, das er zuerst mit Sonnenlicht bestrahlte und dann auf eine vor Licht geschützte photographische Platte einwirken ließ. Tatsächlich wurde diese dadurch belichtet und der Beweis schien erbracht, daß Röntgenstrahlen durch Fluoreszenz hervorgerufen werden. Als Becquerel aber zum Vergleich unbestrahltes Uranfalz verwendete, konnte er dieselben Wahrnehmungen machen. Ganz folgerichtig zog er daraus den Schluß, daß diese durchdringenden Strahlen von den Uranfalten selbständig ausgesendet werden und entdeckte hiermit die radioaktive Strahlung. Uran ist ein Metall mit dem höchsten Atomgewicht (238,2) und kommt in der Pechblende einem Erz, wie es bei Joachimstal in Böhmen, in Sachsen, ferner in Colorado in Nordamerika, im Kongostaat usw. vorgefunden wird. Becquerel fand, daß Uranfalte Strahlen ausenden, die imstande sind, feste Stoffe zu durchdringen und chemische Reaktionen auf einer lichtempfindlichen Silberfaltschicht auszulösen vermögen, was bei geeigneter chemischer Behandlung (Entwickeln) nachzuweisen ist (Schwärzung der Silberfalte). Dem Ehepaar Curie gelang es im Jahre 1898 in der vom Uran befreiten Pechblende noch zwei weitere, weit stärker strahlende Substanzen, nämlich Polonium und Radium zu isolieren. Später entdeckte man noch das Actinium, Thorium, Radiotellur usw., die man kurz unter dem Namen radioaktive Substanzen zusammenfaßt.

Während Röntgenstrahlen durch elektrische Energie erzeugt werden, ist die Entstehung radioaktiver Strahlung auf einen Zerfall des Atoms zurückzuführen. Welche Vorgänge im Atomkern hierzu führen, ist bis heute noch nicht festgestellt. Doch haben die Forschungen von Rutherford und Røys über die Art des Zerfalls und die radioaktiven Strahlen aufgeklärt. Vor allem werden beim Zerfall der Atome Materieteilchen in Form von Heliumatomkernen herausgeschleudert, was man als Alfastrahlung bezeichnet. Alfastrahlen sind doppelt ionisierte Heliumatome, d. h. es bestehen zwei freie Kernladungen. Daher erfahren diese Alfastrahlen im elektro-magnetischen Feld eine Ablenkung im Sinne einer positiven Ladung, entsprechen also den Kanalstrahlen. Die Alfastrahlen machen den Hauptteil der Strahlung aus und stammen aus dem Kern der radioaktiven Substanz.

Eine zweite Form beim Atomzerfall ist gekennzeichnet durch das Herausfliegen von Kernelektronen, d. h. Elektronen, negative Ladungseinheiten, welche die positiven Protonen im Kern des Elements zusammenhalten. Bei den radioaktiven Substanzen sind diese Kräfte offenbar ungenügend vorhanden, daher der Zerfall derselben. Betastrahlen erfahren daher im elektromagnetischen Feld eine Ablenkung, die jener der negativen Ladungen gleichkommt, entsprechen daher den Kathodenstrahlen. Die Betastrahlen entwickeln eine Geschwindigkeit von rund 290 000 km pro Sekunde, also ungefähr Lichtgeschwindigkeit. Alfa- und Betastrahlen sind korpuskuläre Strahlen, lassen sich daher im elektromagnetischen Feld ablenken.

Im Gegensatz dazu läßt sich eine dritte beim Zerfall radioaktiver Substanzen auftretende Strahlenart, die Gamastrahlung durch ein elektromagnetisches Feld nicht beeinflussen. Diese Strahlung stellt nichts anderes dar als eine Wellenbewegung im Äther, ist also nicht korpuskulär, sondern ein Energievorgang. Diese Strahlenart entsteht im Kern, in welchem nach Aussendung von Alfa- und Betastrahlen eine Umlagerung, eine Art Zusammensturz der verbleibenden Teilchen erfolgt. Dieser ruft die Gamastrahlen, die den Röntgenstrahlen wesensgleich sind, hervor. Jede radioaktive Substanz sendet Gamastrahlen von ganz bestimmter Schwingungszahl und Wellenlänge aus. Diese Wellenlänge ist von ganz außerordentlicher Kleinheit, so daß zu ihrer Bestimmung die bei den Röntgenstrahlen angewendete Methode, Kristallgitter zu verwenden, versagte. Genaue, auf anderer Grundlage aufgebaute Berechnungen ergaben aber, daß die Gamastrahlen eine etwa 20mal kleinere Wellenlänge aufweisen als die Röntgenstrahlen. Infolge dieser kürzeren Wellenlänge ist die Durchdringungskraft eine wesentlich stärkere, so daß die Schattenbilder, die man auch mit Hilfe von Gamastrahlen herstellen könnte, nicht annähernd so scharf sind, wie die der Röntgenstrahlen. Man kennt eine ganze Reihe von radioaktiven Stoffen, wie z. B. Radium, Aktinium, Polonium usw., die sich aber alle auf zwei Muttersubstanzen zurückführen lassen, d. h. Abkömmlinge derselben sind, nämlich auf Uran und Thorium. Es würde zu weit führen, auf alle die Zwischenprodukte, die beim Zerfall dieser beiden Elemente entstehen, einzugehen. Daher beschränken sich folgende Betrachtungen nur auf die für uns wichtigste radioaktive Substanz, auf das Radium. Radium hat als Muttersubstanz das Uran. Sein Zerfall verläuft folgendermaßen: Radium geht nach Abgabe von Alfastrahlen über in die gasförmige Emanation, die eine außerordentlich hohe Dichte und das Atomgewicht 222, also um 4 Einheiten weniger als Radium aufweist. Dieses Gas sendet wiederum Alfastrahlen aus (Heliumionen) und geht über in Radium A, das einen festen Körper darstellt, aber rasch weiterzerfällt zu Radium B und weiterhin nach kurzer Zeit zu Radium C. Die Intensität für die einzelnen dabei auftretenden Strahlen ist abwechselungsweise stärker oder schwächer, bzw. für die eine oder andere Art

gleich o. In ähnlicher Weise vollzieht sich weiterhin die Umwandlung über die Zwischenprodukte Radium D (Radioblei), Radium E, F (= Polonium) bis als Endprodukt Radium G übrigbleibt, welches chemisch mit Blei identisch ist, jedoch ein anderes Atomgewicht aufweist.

Die Einwirkung der radioaktiven Substanzen auf lebende Zellen beruht überwiegend auf der Wirkung der Gamastrahlen. Wie die Röntgenstrahlen, so können auch sie schädigende Wirkung auf Organismen ausüben, können aber auch zu Heilzwecken angewendet werden. Die biologische Wirkung der Radiumstrahlen ist wiederholt geprüft worden. Vor allem spielte Dosierung eine große Rolle. In schwacher Form verabreicht wirken sie anregend auf das Leben der Zelle. Sie steigern die Lebensvorgänge, was einer Hyperämie gleichkommt und üben dadurch heilende Wirkung aus; gleichzeitig beeinflussen sie die Nervenendigungen dahingehend, daß vorübergehende Schmerzlinderung eintritt. Es sprechen nun aber die einzelnen Gewebsarten nicht alle gleichstark auf die Strahlung an. Am leichtesten geschädigt werden Zellen, die sich im Stadium der Teilung befinden. Je größer die Vermehrungs- und Wachstumsfähigkeit einer Zellgemeinschaft ist, um so größer ist ihre Empfindlichkeit. So sind z. B. die Blutbildungsstätten, Knochenmark und Milz sehr strahlenempfindlich. Kleine Dosen bewirken eine Vermehrung der weißen Blutkörperchen. Starke, bzw. tödliche Dosen eine beträchtliche Abnahme, ja, die weißen Blutkörperchen können sogar ganz aus dem Blut verschwinden. Knorpel, Bindegewebe und Muskulatur sind wegen des geringeren Umfangs der Lebensvorgänge innerhalb ihres Zellverbandes dementsprechend weniger empfindlich. Auch das periphere und zentrale Nervensystem reagiert nicht besonders stark auf die Bestrahlung. Knochengewebe bedarf intensiver Bestrahlung bis es anspricht. Entzündetes Gewebe und Neoblasmen, also pathologisches Gewebe stellen Gewebe mit gesteigerten Lebensvorgängen dar, d. h. neben erhöhtem Stoffwechsel ist auch eine vermehrte Zellteilung zu verzeichnen. Demzufolge ist auch die Einwirkung von Röntgen- und Gamastrahlen eine äußerst intensive.

Dadurch ist es möglich, durch richtige Dosierung, krankhafte Zelltätigkeit zu schwächen und zu hemmen, die normale Zellfunktion anzuregen. Daher kann Radium sehr wohl zur Heilung von Geschwülsten, Hautkrankheiten, Gicht, Rheumatismus, Neuralgien, Anämie und gynäkologischen Leiden verwendet werden. Bei all diesen Fällen stehen Hyperämie bzw. vermehrte Zellteilung im Vordergrund, was als Hauptangriffspunkt für die Strahlen in Betracht kommt. Da aber Lokalisation, Ausdehnung und pathologische Veränderung bei den betreffenden Krankheiten stark voneinander verschieden sind, ist es auch nötig, in der Applikation Unterschiede bezüglich Übertragungsmittel (Träger der Substanz) und Intensität der Strahlenwirkung zu treffen. Normalerweise greift man zur unmittelbaren Bestrahlung mit festen radiumsalzhaltigen Stoffen.

In vielen Fällen jedoch wendet man auch Injektionstherapie, Inhalations- oder Badekuren an. Ein nicht zu schnell zerfallender radioaktiver Stoff wird nahe der erkrankten Stelle injiziert. Von dort aus breitet er sich auf dem Blutweg in die Umgebung aus, wobei er gleichzeitig seine Strahlenwirkung entfaltet. Die letzte Entscheidung, welche Methode anzuwenden ist, bringt aber immer die Untersuchung der im speziellen Fall vorliegenden Verhältnisse durch den Spezialisten.

Nicht selten entstehen im Bereich der Mundhöhle Prozesse, die eine Behandlung durch radioaktive Strahlung angezeigt erscheinen lassen. Daher ist es sehr wohl angebracht, daß auf die Anwendungsmöglichkeiten von radioaktiven Substanzen in der Zahnheilkunde näher eingegangen wird.

Von den entzündlichen Prozessen in der Mundhöhle stehen diejenigen des Aufhängeapparates der Häufigkeit nach im Vordergrund. Normalerweise geht man in der Zahnheilkunde bei der Behandlung solcher Fälle so vor, daß man nach Beseitigung der Ursachen (infizierter Wurzelkanal, mechanische oder chemische Reize auf den Zahn oder dessen nächster Umgebung) versucht, die Entzündung des Periodontiums durch reizlose Medikamente zum Abklingen zu bringen, oder, falls bereits eine Infektion des periapikalen Gewebes erfolgt ist, durch Wärmeapplikation die Abziedierung zu beschleunigen um dann zur Vermeidung weiterer Nachschübe nach einer bakteriziden, festen Wurzelfüllung die Wurzelspitze zu resezieren.

Zum erstenmal wurde Radium zur Behandlung von akuten und chronischen Periodontitiden, also entzündlichen Prozessen der Wurzelhaut, im Jahre 1912 von Levy in der Zahnheilkunde angewendet. Es zeigte sich, daß derartige Prozesse schnell auf die Bestrahlung ansprachen und daher die Behandlungsdauer wesentlich herabgesetzt wurde. Eine einmalige Bestrahlung führte innerhalb 24 Stunden schon eine wesentliche Besserung und Verschwinden der Symptome herbei. Chronische Periodontitiden, mit ihren Folgeerscheinungen, Granulom und Cyste, müssen fast immer operativ angegangen werden. Die Radiumbestrahlung ermöglicht es, unter Erhaltung der Wurzelspitze die Erkrankung zur Rückbildung zu bringen. Ein Granulom enthält reichlich Lymphocyten, Leukocyten und Blutgefäße, stellt also ein Gewebe mit erhöhter Lebenstätigkeit dar. Durch die Bestrahlung werden die Lebensvorgänge noch mehr gesteigert, eine Hyperämie hervorgerufen, verbunden mit einem weiteren massenhaften Auftreten von Leukocyten, die einen raschen Abtransport von Zerfallsprodukten bewirken. Bei folgenden periodontitischen Prozessen ist nach Levy eine Radiumbehandlung besonders indiziert:

1. Periodontitiden, bei denen medikamentöse Behandlung versagt.
2. Periodontitiden, bei denen infolge Verkalkung der Wurzelkanäle eine einwandfreie Versorgung derselben nicht gewährleistet ist.
3. Bei Angst der Patienten vor chirurgischen Eingriffen.

4. Als Nachbehandlung, wenn der chirurgische Eingriff nicht den gewünschten Erfolg erbrachte.
5. Wenn durch die Ausdehnung des Krankheitsherde der Halt des Zahnes nach der Wurzelspitzenrefektion bedroht wäre.
6. Bei Nähe des Foramen mentale, da in diesem Falle bei einem operativen Eingriff die hier austretenden Nerven gefährdet würden.
7. Bei Nähe der Highmershöhle, also bei Prozessen an den oberen Prämolaren und Molaren.
8. Wenn infolge bereits vorliegender prothetischer Arbeiten ein Angehen des erkrankten Zahnes Schwierigkeiten bereiten würde.
9. Wenn Hämophilie, Diabetes, Herzfehler usw. vorliegen, so daß bei einem Eingriff unangenehme Folgen zu gewärtigen wären.

Die Technik der Bestrahlung ist in all diesen Fällen sehr einfach. Mittels Prothesen aus plastischem Abdruckmaterial wird das Radiumpräparat direkt am Ort der Wahl angebracht. Levy empfiehlt hierzu bei Periodontitis 40 mg Radiumbromid auf die Dauer von 1 Stunde zu applizieren. Bei der Bestrahlung von Granulomen und Cysten verwendet man ausschließlich harte Gammastrahlen, die eine Einschmelzung und Rückbildung des entzündeten Herdes bewirken.

Diese periodontitischen Erkrankungen nehmen nicht selten ihren Ausgang von einer Wurzelfüllung, die infolge der ungünstigen Kanalverhältnisse (Ramifikationen) unvollkommen ist. Um dem vorzubeugen, verwendete Levy prophylaktisch eine Wurzelpaste, die eine radioaktive Substanz enthält. Damit wollte er erreichen, daß einem Eindringen und einer Vermehrung von Erregern in den nicht von der Füllung erfaßten Seiten- und Dentinkanälen entgegengewirkt wird. Levys Paste, Radiolix genannt, besteht aus einem radioaktiven Pulver, Thoriumhydroxyd und einer jodabspaltenden Flüssigkeit. Natürlich darf die Strahlung bei einer derartigen Dauerfüllung nicht zu intensiv sein, um eine etwaige Schädigung des umliegenden Gewebes zu vermeiden. 1 Gramm Radiolix, mit dem bis zu 10 Wurzeln gefüllt werden können, enthält daher nur 1,5/1000 mg Radiothor. Auf eine Füllung treffen daher 1,5/10 000 mg der radioaktiven Substanz. Die Strahlung ist daher absolut unschädlich, bewirkt jedoch eine Sterilisation der Wurzelkanäle mit ihren Verzweigungen und der Dentinkanälchen. Durch den Gehalt der jodabspaltenden Flüssigkeit eignet sich Radiolix auch zur Gangränbehandlung, da diese Jodverbindung auf die Anaerobier stark einwirkt. Säurehaltige Zemente würden eine Abspaltung freien Jodes begünstigen und dadurch eine Verfärbung des Zahnes herbeiführen. Es muß daher bei Radiolix eine neutrale Zwischenschicht (Guttapercha) angewendet werden. Auch als Pulpenamputationspaste hat sich Radiolix bewährt und wird so allen Anforderungen gerecht, die an eine Wurzelpaste gestellt werden. Es ist gewebefreundlich, baktericid und durch den

Gehalt an Thorium röntgenpositiv. Zur Behandlung von entzündlichen Prozessen in der Umgebung des Zahnes, also margineller Gingivitis, Stomatitis, Pforiasis usw. führte Levy ebenfalls das Radium erfolgreich ein. Auch hier nützte er die günstige Wirkung der Strahlen auf Entzündungsgewebe aus.

Die guten Erfahrungen bei der Behandlung von Entzündungen mit Radium legten den Gedanken nahe, auch bei Entzündungen der Pulpa den heilsamen Einfluß der radioaktiven Strahlen zu verwerten. Leift konnte aber lediglich bei Verwendung ungefilterter Präparate einen Erfolg verzeichnen. Als Träger für Dosen zwischen 6 und 50 mg benützte er Platinbehältnisse von 0,3 mm Wandstärke. In dieser Form konnte die Bestrahlung aber nur bei größeren Kavitäten, also beispielsweise zentralen Kavitäten von Molaren durchgeführt werden. Für kleinere kariöse Defekte benützte er 0,01 bzw. 0,02 mg. Radiumelement, wobei er Salze desselben mit Silikatzement mischte und das Gemenge mit der entsprechenden Flüssigkeit (Phosphorsäure), angerührt in die betreffende Kavität einbrachte. Es zeigte sich, daß eine Schmerzlinderung nur dann eintrat, wenn die Pulpa eröffnet war. Dieser Umstand ist wohl darauf zurückzuführen, daß für den Fall des geschlossenen Kavums die durch die Bestrahlung gesteigerte Hyperämie einen gesteigerten Druck auf die Nervenendigungen (Unmöglichkeit der Tumorbildung infolge der anatomischen Verhältnisse) und damit erhöhten Schmerz herbeiführte. Die Anwendung des Radiums bei Pulpitis erwies sich also der üblichen Therapie bei Pulpitis (Anwendung desinfizierender, entzündungshemmender Medikamente wie Chlorphenol oder Devitalisation mit anschließender Wurzelbehandlung) nicht ebenbürtig.

Für die bei Pulpitiden oft notwendige Devitalisation der Pulpa wurden gewöhnlich Arsenpräparate benützt. Die Erkenntnis, daß bei starker und langer Bestrahlung von hyperämischem Gewebe dieses zur Nekrose gebracht wird, führte dazu, Radiumbestrahlung auch zur Devitalisation der entzündeten Pulpa zu versuchen. Eine Bestrahlung mit 0,001 gr. Radium auf die Dauer von 6 bis 12 Stunden brachte die Pulpa zur Nekrose. Das histologische Bild, das sich dann darbot, unterschied sich wesentlich von dem der Arsenpulpa. Während bei letzterer reichlich kleinzellige Infiltration zu verzeichnen war, fehlte diese hier vollständig.

Bei entzündlichen Prozessen im Aufhängeapparat des Zahnes, Trigeminusneuralgien, Nachschmerzen nach Zahnextraktionen und sonstigen Eingriffen verwendet man gerne Wärmebestrahlungen (Ultrarot) mit Hilfe der Soluxlampe oder Ultraviolettbestrahlung mit der Höhensonne. Dieselbe Wirkung wie mit diesen kann man auch erzielen, wenn man sogenannte Radiokompressen zur Anwendung bringt. Hierbei handelt es sich um eine Radiumschwachbestrahlung. Radium wird dabei in sehr geringer Menge und in geeigneter Form in Kissen eingenäht und diese wiederum in Gummistoff ein-

gehüllt. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, daß der Patient auch nachts diese Kompressen tragen kann und dadurch die Heilung beschleunigt wird.

Natürlich stellen diese Radiumkompressen in Fällen ausgeprägter Neuralgien nur unterstützende Momente zu der hier unerläßlichen spezifischen Behandlung dar. Diese besteht, je nachdem die Ursachen exogen oder zentral bedingt sind, darin, daß man im ersten Fall die Ursachen (Knochenkanten, verlagerte Zähne, verdrängend wachsende Tumoren usw.) beseitigt oder die betreffenden Nervenstämme an ihren Austrittsstellen exstirpiert, und die Foramina plombiert, um ihre Regeneration zu vermeiden; auch die Alkoholinjektion kann hier vorübergehend oder dauernd zum Erfolg führen. Im zweiten Fall, bei zentraler Ursache, geht man so vor, daß man entweder Alkoholinjektion ins Ganglion ausführt oder das Ganglion exstirpiert.

Bei Neuralgien kam auch noch die Injektion von radioaktiven Substanzen zur Anwendung. Man benützte hierzu eine Lösung von Radiumsalzen und Atophan, von der man 12 Dosen à 2 ccm (0,5 Gr. Atophannatrium und 0,001 mg Radium) in Abständen intravenös injizierte. Nach den ersten Injektionen trat zunächst eine Verschlimmerung des Zustandes ein, was aber durch Verabreichung von Anaesthetica in erträglichen Grenzen gehalten werden konnte. Nach Beendigung der Kur waren die Patienten nach $\frac{3}{4}$ Jahren noch anfallsfrei. Sicherer waren die Erfolge allerdings, wenn man statt der intravenösen Injektion direkt ins Ganglion Gasseri spritzte und sich hierbei die schon früher eingeführte Alkoholinjektion als Vorbild nahm. Demnach ist die Radiophaninjektion der Alkoholinjektion zum mindesten ebenbürtig. Als Vorzug gegen letztere sei noch auf die Tatsache hingewiesen, daß bei der Radiophaninjektion die narbigen Einziehungen nur in geringerem Umfang zu beobachten waren.

Im Gebiet der Mundhöhle kommt es, wenn auch glücklicherweise nicht allzuhäufig, vor, daß vom Zahnsystem ausgehende eitrige Prozesse sich diffus im Gewebe ausbreiten und so die gefürchtete Phlegmone hervorrufen, besonders gefährlich durch die hier gegebenen Ausbreitungsmöglichkeiten in die Meningen, den Pharynx oder Mediastinum. Um dem zu begegnen, wird allgemein das infiltrierte Gebiet mit breiten Schnitten eröffnet und mittels Wärmebehandlung dessen Einschmelzung und nachfolgende Abzedierung beschleunigt.

Jugel behandelte dagegen mit Erfolg durch $\frac{1}{2}$ - bis 1-stündige Bestrahlung mit 1,5 mg Radium. Setzte diese Behandlung schon ein, bevor eine Einschmelzung des befallenen Gewebes eingetreten war, so blieb diese entweder aus, und es kam zur Restitutio ad integrum oder es bildete sich eine Demarkation, deren Inneres rasch verflüssigt wurde, wobei es zuweilen spontan zum Durchbruch kam. Somit wurde die Heilung des Prozesses wesentlich beschleunigt, so daß schon 10 Stunden nach der Bestrahlung Besserung, d. h. Ver-

minderung des Spannungsgefühles, Minderung der Schmerzen und steiler Abfall des Fiebers eintrat.

Die verhältnismäßig geringen Erfolge, die man bei rein medikamentöser Behandlung der Alveolarpyorrhoe speziell ihrer chronischen Form der Parodontose erzielte, führte dazu, daß man auch die Gammastrahlen zur Heilung einführte. E i f e x wandte die kombinierte Methode des Auspitzens (Atomiseur) und Auspülens sowie direkte Bestrahlung mit Erfolg an. Er benützte zum Auspitzten eine emanationshaltige Lösung von 1200 M. E. und konnte damit im Laufe von 14 Tagen eine wesentliche Besserung feststellen. Taschen an oberen Frontzähnen bestrahlte er mit 3,03 mg Radiumbromid, das in Glasröhrchen eingeschlossen war. Innerhalb 4 Wochen bestrahlte er viermal je 5 Minuten und dreimal je 10 Minuten. Nach einer Latenzzeit von 4 Wochen, während der sich kein Erfolg zeigte, war eine Restitutio ad integrum festzustellen. Rezidive traten nicht auf. T r a u n e r verordnete Radiumemanation zu Spülungen, wozu er emanationhaltiges Wasser von 275 M. E. anwendete. Der Patient erhielt täglich 300 ccm zum Spülen. Natürlich wurde vorher auch eine gründliche Reinigung der Zähne von allen Auflagerungen vorgenommen. Auf diese Behandlung hin verschwanden die Symptome. L e v y verordnete Trinkkuren mit radiumhaltigen Wasser, Zahnfleischmassagen mit eben solchen Pasten und Injektionen mit löslichen Radiumsalzen. Zur Trinkkur verschrieb er dreimal 1 Lösung von 333 M. E. Nach einem Monat waren die Zähne nicht mehr locker und das Zahnfleisch hatte seine normale Lage und Festigkeit. Die Erfolge mit der Pastenmassage und der Injektionsmethode waren ebenso gut. Infolge der verschiedenen Ätiologie ist natürlich individuelle Behandlung notwendig. M a m l o c k beschritt ähnliche Wege und konnte ebenso gute Erfolge verzeichnen.

M a m l o c k war es auch, der die Forderung aufstellte, radioaktive Substanzen in der Zahn- und Mundpflege weitgehendst zu verwenden. Er ging von dem Standpunkt aus, daß es wesentlich wichtiger sei, die natürlichen Abwehrkräfte des Mundes zu mobilisieren, anstatt mit Hilfe von Chemikalien eine antiseptische Wirkung hervorzurufen. Für den Fall, daß diese Medikamente so stark waren, eine wesentliche Wirkung auf die eingedrungenen Krankheitskeime auszuüben, war gleichzeitig eine unerwünschte Schädigung der Mundschleimhaut und der Zähne unvermeidlich. Waren dagegen diese Stoffe, eben um diese Mängel auszuschalten, entsprechend verdünnt, so war ihre Wirkung auf Mikroorganismen gleich Null. Andererseits stellt eine normal reagierende gesunde Schleimhaut den besten Schutz gegen Infektionen aller Art dar. Das geeignete Mittel zur Anregung natürlicher Abwehrkräfte sieht M a m l o c k in der Strahlung radioaktiver Substanzen. Unter diesen Gesichtspunkten schuf man die Zahncreme „Doramad“. Sie enthält als wirksamen Bestandteil neben den üblichen Zusätzen wie Schlemmkreide, Menthol,

usw. vor allem das Radiothor und zwar sind in der PASTE 0,05% aktiviertes Thoriumhydroxyd von der Stärke 1500 M. E. Dagegen fehlen vollständig jegliche schädliche Chemikalien. Da die Substanz Radiothor sehr beständig ist, behält die PASTE über Jahre hinaus ihre Wirksamkeit. Doramad entfacht eine außerordentlich günstige Wirkung auf das Zahnfleisch und noch 4 Stunden nach Gebrauch konnte man ihre Wirkung im Munde nachweisen. Untersuchungen von Jügel ergaben, daß nach 14 tägigem regelmäßigen Gebrauch der Blutdruck in den Papillen konstant wesentlich erhöht war, was einen Beweis für die verbesserte Durchblutung darstellt. Bei Benützung der gewöhnlichen Zahnpflegemittel war die Steigerung des Blutdruckes nur vorübergehend. Die Einführung radioaktiver Stoffe in die Zahn- und Mundpflegemittel stellt somit einen erheblichen Fortschritt auf diesem Gebiete dar.

Wenn im vorhergehenden die radioaktiven Substanzen wesentlich nur zu vorbeugenden Maßnahmen verwendet wurden, so benützt man in folgenden Fällen die radioaktive Strahlung hauptsächlich dazu, pathologische Bildungen im Gewebe anzugehen und zur Heilung zu bringen. Bei Epulis, einer im Bereich der Mundhöhle nicht selten auftretende Neubildung, wird z. B. Radiumbestrahlung häufig mit Erfolg angewendet. Bei dieser Krankheit haben wir es vordringlich mit zwei Formen zu tun, der Epulis fibromatosa, bei welcher das bindegewebige Element vorherrscht und der Epulis giganto-cellularis, bei welcher zellige Elemente hauptsächlich im Vordergrund stehen. Bei beiden Formen aber handelt es sich nicht um eine Gewebsneubildung, im Sinne eines malignen Tumors mit dem Kennzeichen der unreifen Zellen, sondern um Gewebe, die infolge Störungen des im Organismus herrschenden Gleichgewichts (Gravidität) usw. als Reaktion auftreten. Als therapeutische Maßnahme hierfür wird für gewöhnlich totale Exzision angegeben. Daneben wird aber auch ausschließlich Strahlenbehandlung beschrieben. Zur Behandlung greift man dabei zu Radiumtuben, sogenannten Dominiciröhrchen. Als Haltevorrichtung hierfür haben sich Stentsprothesen bestens bewährt. Der Vorteil der Strahlentherapie liegt in der Vermeidung größerer Defekte und Opferung von Zähnen, was beim chirurgischen Eingriff manchmal unvermeidlich ist. Noch größere Sicherheit für den Erfolg bietet natürlich eine kombinierte Methode: Operation und Nachbestrahlung.

Auch bei Hämangiomen und Lymphangiomen suchte man durch Radiumbestrahlung die blutige Heilmethode zu umgehen. Bei Kindern führte denn auch die Bestrahlungsmethode zu besten Erfolgen, während bei Erwachsenen (nach Levy) dieses Ziel nur in den seltensten Fällen befriedigend erreicht wurde. Im Gegensatz hierzu soll bei Leukoplakie eine Radium- und Mesothoriumbestrahlung angeblich zum Dauererfolg geführt haben.

Das klassische Gebiet für Radiumbestrahlung in der Zahnheilkunde ist jedoch genau wie in der Allgemeinmedizin auf dem Gebiete der Bekämpfung patho-

logischer Gewebsbildungen, der Tumoren zu fuchen. Strahlenbehandlung und chirurgische Maßnahmen müssen sich hier oft ergänzen bzw. ersetzen.

Zur Behandlung werden Nadeln benützt, die die radioaktive Substanz enthalten. Diese Nadeln werden auf zweierlei Weise appliziert: a) intratumoral, b) extratumoral. Im ersteren Falle werden die radiumhaltigen Nadeln in die Geschwulst unter Narkose eingeführt, und das gesunde Gewebe durch Bleiplättchen, Protektoren genannt, abgedeckt und so vor Schädigung bewahrt. Man benötigt für die Bestrahlung ungefähr 8—12 Nadeln, für die Dauer von 7 bis 10 Tagen und zwar so, daß die Dosis rund 1600—2600 mg Stunden beträgt. Um einen Verlust oder ein Herausfallen einzelner Nadeln zu verhindern, werden diese durch Silkwormfäden gesichert, die wiederum untereinander verknotet sind. Bei der extratumoralen Bestrahlung, die man anwendet, wenn die vorige Methode nicht auszuführen ist, wird ein Applikator eingeführt. Dabei wird die Oberfläche des Tumors bestrahlt, wobei sich die radioaktive Substanz in dem Träger befindet. Diese Radiumträger werden nach Abdruck aus Kautschuk hergestellt und enthalten zur Aufnahme der Radiumnadeln eine bleiausgekleidete Ausparung. Ehe das Radium eingeführt wird, muß die Mundhöhle peinlichst saniert werden. Metallfüllungen, Kronen und Brücken sind zu entfernen, um Sekundärstrahlungen zu vermeiden. Aus dem gleichen Grunde darf zur Herstellung der Basiskautschukplatte nur ungefärbter Kautschuk verwendet werden. Die Farbstoffe, die in der Regel dem Kautschuk zugesetzt werden, enthalten Zinnober (Quecksilberoxyd) was ebenfalls Sekundärstrahlungen hervorrufen kann. Bei der Oberflächenbestrahlung werden die Nadeln in einem Abstand von 12 bis 15 mm von der Tumoroberfläche befestigt. Man bestrahlt etwa 10—20 Tage mit ungefähr 5 mg-Nadeln. Falls größere Mengen Radium zur Verfügung stehen, vergrößert man den Abstand zwischen Tumor und strahlender Substanz zur Erzielung einer größeren Tiefenwirkung. Sogenannte Radiumkanonen, d. h. Behälter mit etwa 2—3 g Radium läßt man in einem Abstand von 6 cm 2—3 Wochen lang auf den Tumor einwirken. Die erforderlichen Dosen schwanken zwischen 60 000—100 000 mg-Stunden.

Der Vorteil der Intratumoralbestrahlung liegt darin, daß einerseits das Tumorgebiet gleichmäßiger durchstrahlt und vom gesunden Gewebe schärfer abgegrenzt werden kann. Bei all diesen therapeutischen Maßnahmen ist der Zahnarzt nur mittelbar beteiligt. Die eigentliche Durchführung der Bestrahlung ist Sache des Spezialisten.

Die Aufgabe des Zahnarztes besteht im wesentlichen darin, im gegebenen Fall ihm die geeigneten Hilfsmittel, Haltevorrichtungen für Radium, in die Hand zu geben, wenn es sich darum handelt, im Mundbereich Bestrahlungen durchzuführen. Daraus geht allein schon hervor, daß nur bei extratumoraler Bestrahlung die Mitarbeit des Zahnarztes notwendig wird. Von der zu

schaffenden Apparatur fordert man einfache und billige Konstruktion, leichte Einführbarkeit und sichere Befestigung, Bequemlichkeit für den Patienten und Unverschieblichkeit während der Dauer der Behandlung. Für die daran angebrachte radioaktive Substanz hingegen, soll ein gewisser Spielraum vorhanden sein. Es bedurfte der Erfahrungen eines größeren Zeitraums, bis es gelang, diesen Forderungen hinreichend gerecht zu werden.

Ursprünglich befestigte man die Präparate mittels Heftpflastern oder Klammern auf der Schleimhaut. Dann ging man dazu über, Prothesen aus plastischen Abdruckmassen herzustellen; aber davon ist man wieder abgekommen. Um Deformationen dieser Masse zu vermeiden, und den Prothesen genügend Festigkeit zu verleihen, mußten sie ziemlich dick angefertigt werden. Außerdem war es schwierig, die Apparatur unverrückbar zu fixieren. So ging man schließlich dazu über, Haltevorrichtungen aus Kautschuk anzufertigen, die aber auch nur in bestimmten Fällen zur Anwendung kommen können.

Der Umfang der Prothese und die Art der Befestigung (Klammern), sind es vor allem, die diese beschränkte Verwendungsmöglichkeit mit sich bringen. Es sind ja meist genügend Zähne vorhanden, die eine Befestigung der Radiumprothese im Oberkiefer ermöglichen. Wegen der Verschieblichkeit während der Bestrahlung ist die Befestigung im Unterkiefer unzweckmäßig und nur, wenn sich das zu bestrahlende Gebiet hier befindet, wird die Apparatur an den unteren Zähnen befestigt. Heute ist man dazu übergegangen, solange Zähne als Stützpunkte zur Verfügung stehen, Metall als Werkstoff zu benutzen. Man beschreitet dabei folgenden Weg: Die noch vorhandenen Zähne werden mit Metallbändern versehen und an diese gleichlaufend mit dem Alveolarrand ein Drahtbügel verlötet. Über diesen Bügel wird eine Gleitschiene geschoben, die mit Hilfe einer Stellschraube sich arretieren läßt. An der dem Tumor zugewendeten Seite bringt man dann für den Radiumbehälter ein Drahtgestell an, dessen Form der des ersteren angepaßt, also zylindrisch oder kastenförmig ist. Die Gleitschiene mit der Stellschraube ermöglicht eine beliebige Einstellung des Radiumbehälters.

Ist der Oberkiefer unbezahnt, so ist eine Kautschukplatte indiziert. Man geht zunächst so vor wie bei der Anfertigung eines oberen Totalersatzes. Man nimmt Abdruck, stellt die Bißhöhe fest und vulkanisiert die so entstandene Gaumenplatte in Kautschuk, wobei man eine Kanüle mit Klemmschraube an geeigneter Stelle einläßt. Durch diese Kanüle wird ein starker Draht mit seinen freien Enden geschoben und kann durch die Klemmschraube in beliebiger Stellung und Lage fixiert werden. Das andere Ende des Drahtes ist mit dem Träger für den Radiumbehälter verlötet. Im ungünstigsten Falle, wenn Ober- und Unterkiefer unbezahnt sind, muß eine extraorale Fixation zu Hilfe gezogen werden.

Normalerweise wird die chirurgische Methode bei der Behandlung von

Tumoren auch in der Mundhöhle angewendet. Die unbefriedigenden Ergebnisse aber ließen eine Vor- und Nachbestrahlung mit radioaktiven Substanzen angezeigt erscheinen, was eine beträchtliche Verbesserung der Operationsergebnisse mit sich brachte und Rezidive viel seltener auftraten. Bei inoperablen Fällen ging man nur mittels Bestrahlung vor. Die Radiumpunktur eines Zungentumors stellt z. B. einen wesentlich gefahrloseren Eingriff dar, als der rein chirurgische. Hingegen Oberkiefer-Carcinom und Pharynx Tumoren sind nach Gericke am besten radikalchirurgisch anzugehen.

Zur Illustration der Bedeutung einer Radiumbehandlung im Gebiet der Mundhöhle für Tumoren seien kurz die Ergebnisse, welche im Collis P. Huntington Memorial Hospital bei der Heilung von Carcinom an den Tonfillen in der Zeitspanne von 12 Jahren (1921—1933) erzielt wurden, dargestellt. Während dieser Zeit wurden in dem Institut 240 Fälle von Tonfillen-Ca aufgezeichnet, wovon 118 behandelt wurden. Der Rest kam nur der Diagnose wegen oder verzichtete wegen Ausichtslosigkeit auf die Einleitung einer Therapie (99).

Man behandelte zunächst operativ mit darauffolgender Radiumnachbestrahlung (10 Fälle); dann ging man dazu über, statt mit Radium mit Röntgenstrahlen nachzubehandeln (4 Fälle). Schließlich verließ man die blutige Methode überhaupt, um zuerst Radiumbestrahlung (Implantationsmethode) mit Röntgen nachbestrahlung anzuwenden. Das Gesamtergebnis stellt sich folgendermaßen dar: Man verzeichnete bei den 118 behandelten Fällen

43 Fälle	ohne Besserung
23 Fälle	ohne Rezidive
47 Fälle	Rezidive innerhalb von einem Jahr
2 Fälle	Rezidive zwischen 1—2 Jahren
2 Fälle	Rezidive zwischen 2—5 Jahren
1 Fall	Rezidive nach 5 Jahren.

Besser läßt sich die Überlegenheit der reinen Strahlenbehandlung gegenüber anderen Methoden aus folgender Tabelle ersehen:

Behandlungsjahr:	behandelte Fälle:	geheilt:
1921	26	1
1924	17	1
1925	16	1
1928	16	1
1929	11	1
1931	9	3
1932	11	5
1933	11	5

Die Schlußfolgerung, die sich daraus in Bezug auf die Art der Behandlung ziehen läßt, drückt der Vermittler des vorstehenden Berichtes folgendermaßen aus: „Nach unserer Erfahrung hat man mit dieser Methode am ehesten Erfolg, ohne daß sie dem Patienten unerträglich wäre oder ihn einer langen stationären Behandlung unterwirft.“

Die radioaktiven Substanzen stellen, wie aus dem Vorhergehenden zu ersehen ist, auch in der Zahnheilkunde ein wertvolles Hilfsmittel dar, um pathologische Zustände im Bereich der Mundhöhle bekämpfen zu können. Leider stellen sich einer unbeschränkten Anwendung alle möglichen Hindernisse in den Weg. Vor allem spielt hier das geringe Vorkommen und der dadurch bedingte hohe Preis der betreffenden Substanzen eine große Rolle. Die meisten Institute und noch weniger der Arzt in der Privatpraxis verfügen nicht über die genügenden Mengen, um eine Therapie ausführen zu können.

Auf keinen Fall aber wird es möglich sein, eine Strahlenbehandlung, sei es eine solche mit Radium oder aber auch mit Röntgenstrahlen, ohne Hinzuziehung eines Spezialisten für dieses Gebiet durchzuführen. Die Indikation ist nämlich derart begrenzt, daß man infolge der Gefährlichkeit der Mittel und deren schwierige Anwendungsmethoden durch die Hand des Ungeübten mehr Schaden als Nutzen anrichten kann. Wie so oft in anderen Fällen ist es beim Gebrauch des Radiums zu therapeutischen Zwecken in der Zahnheilkunde unumgänglich notwendig, daß die kompetenten Stellen, in unserem Falle Zahnarzt und Röntgen- bzw. Radiumspezialist Hand in Hand arbeiten. Während jener oft in die Lage kommt, als erster einen Fall zu diagnostizieren, der einer Strahlenbehandlung zuzuführen ist, trifft letzterer über den einzuschlagenden Weg die Entscheidung, bestimmt die Form der Applikation und gibt gegebenenfalls dem Zahnarzt wiederum die Anleitung zur Herstellung eines geeigneten Trägers für die Radiumpräparate. Für eine ersprießliche Zusammenarbeit zwischen beiden Teilen ist es natürlich nötig, daß jeder über Umfang der Tätigkeit die Grenzen der Arbeitsmöglichkeit des anderen weitgehendst unterrichtet ist. Bei ausgedehnten pathologischen Veränderungen, wie sie besonders die malignen Tumoren darstellen, reiht sich als dritter Helfer im Kampf gegen die Krankheit noch der Chirurg ein. Auch hier sind die Voraussetzungen für erfolgreiche Tätigkeit dieselben, wie die oben angeführten. Erst wenn sich die einzelnen Zweige der Heilkunde so in zielstrebigter Weise verbinden, besteht Aussicht, erfolgreich einen Kampf gegen pathologisches Geschehen führen zu können.

Zum Schluß möchte ich Herrn Professor Dr. Voltz für die Überlassung des Themas und die freundlichen Anweisungen herzlich danken.

Lebenslauf

Am 28. Mai 1913 wurde ich, Schöpperl Elisabeth, zu Regensburg geboren. Nach Besuch des Mädchenrealgymnasiums der Engl. Fräulein zu Regensburg bestand ich daselbst im Februar 1932 die Reifeprüfung. Nach 3½jährigem Studium approbierte ich im Mai 1936 in München als Zahnärztin.

Literaturangabe:

- Apfelstaedt: Haltevorrichtungen für Radiumträger (Dtsch. Monatschrift für Zahnärzte 1927).
- Berven: Radiumbehandlung der malignen Mundhöhlentumoren (Dtsch. Monatschrift für Zahnheilkunde 1933).
- Farber: Der gegenwärtige Stand der Radiumtherapie in der Zahnheilkunde (Diff., Bonn 1932).
- Gudzent: Grundriß zum Studium der Radiumtherapie.
- Gericke: Radiumchirurgie (D. Z. M. 1935, Nr. 11).
- Howkins: Applikationsform bei Tumoren (D. Z. M. 1931). — Radium und seine zahnärztliche Applikation (Zahnärztliche Monatschrift 1930).
- Jugel: Anwendung des Radiums bei Phlegmonen (D. Z. W. 1903, Nr. 33). — Radiumschwachbestrahlung mit Radiumkieferskompreß „Radiogenkompreß“ (D. Z. W. 1930, Nr. 33). — Blutdruckmessungen am Zahnfleisch (Dtsch. zahnärztl. Zeitungen 1923, Nr. 12).
- Kohlmeier: Radiumtherapie in der Zahnheilkunde (D. Diff., Würzburg 1932).
- Lazarus: Handbuch der Radium-Biologie und -Therapie.
- Levy: Eignung radioaktiver Stoffe als Wurzelfüllmaterial (Zahnärztl. Rundschau 1935, Nr. 23). — Indikation für die Radiumbestrahlung in der Mundhöhle (Zahnärztl. Rundschau 1930, Nr. 18).
- Mamlock: Radioaktive Substanzen im Dienste biologischer Mundpflege (Zahnärztl. Rundschau 1929, Nr. 46).
- Müller: Über die Anwendung radioaktiver Elemente in der Zahnheilkunde (D. Z. W. 1922).
- Nordgaard: Radioaktive Wurzelfüllung (Zahnärztl. Rundschau 1935, Nr. 19).
- Rosenberg: Applikation bei Tumoren (Zahnärztl. Rundschau 1930, Nr. 10).
- Schall: Carcinoma of the tonsil (The New England Journal of Medicine 29. 11. 34).
- Slawyk: Der Mikrokosmos nach neueren physikalischen Forschungen.
- Simone: Licht- und Strahlentherapie in der Zahnheilkunde (Schweizerische Zeitschrift für Zahnheilkunde 1935, Nr. 7).
- Wallach: Die Anwendung radioaktiver Strahlen bei der Zahn- und Mundpflege (Zahnärztl. Rundschau 1929, Nr. 24).
- Wolf: Radiolix (Zahnärztl. Rundschau 1934, Nr. 30).